



Stoma ve Yara bakımı
Eğitim Hemşireliği Bölümü tarafından
yatağa bağımlı hastalar ve aileleri için
hazırlanmıştır

www.hastane.akdeniz.edu.tr

Form-70 02 40 60 100 Rev.No:00



[akdenizunihastanesi](#)



[akdenizUnivHastanesi](#)



Stoma ve Yara bakımı
Eğitim Hemşireliği Bölümü tarafından
yatağa bağımlı hastalar ve aileleri için
hazırlanmıştır



Yatak (bası) yaralarını ÖNLEME REHBERİ

Yatak (Bası)Yaraları Önlenebilir Yaralardır

İçindekiler

Giriş	3
Yatak yarası nedir? Nasıl oluşur?	4
Risk grubunda olanlar;	5
Vücudumuzda en çok basınca maruz kalan ve yatak yarası açılan bölgeler;	5
Yatak yarasından korunmak için neler yapmalıyız?	6
Yatak yarasının evreleri	6
Yatak yarası niçin önemlidir?	6
Yatak yarasını nasıl önleyebilirsiniz?	7
Vücut temizliği	9
Erken dönemde yatak yarası işaretlerini nasıl fark ederiz?	11
Dikkat etmemiz gereken hususlar	11
Kaynaklar	12

Giriş


Yatağa bağımlı ya da hareket kısıtlılığı olan hastalarda, yatak yaraları açılabilir. Yatak yaraları, hem hastanın yaşam kalitesini etkilemekte hem de hastaya bakan aileler ve sağlık personeli içinde önemli bir sorun olabilmektedir.

Bu kitapçık; hastalara daha kaliteli ve konforlu bakım yapılarak yatak yarası açılmasının önlenmesi, ailelere ve bakıcılara yol gösterici olması amacıyla düzenlenmiştir. Yatak yaraları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz ilgili sağlık personeline başvurabilirsiniz.

Yatak Yarası Nedir? Nasıl Oluşur?

Yatak yarası, bireyin hep aynı pozisyonda kalması, kendi kendine pozisyon değişimi yapamaması nedeniyle, özellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerin uzun süreli baskıya (basınca) maruz kalması sonucunda cildin bir bölümünde oluşan hasar veya yaradır.

Bazen de hastanın yatakta kendi kendine kayması sonucu sürtünme ve doku yırtılması görülür.



Şekil.1: Yatak yarası oluşumu


4

Risk grubunda olanlar;

Pozisyon değişimini kendi başına yapamayan, ya da kısıtlı yapan duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olanlar, yaşlılar, şeker hastaları, felçli hastalar, ameliyat geçirmiş hastalar, doğuştan anomalisi olanlar, geçirilmiş trafik kazaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı olanlar, yatağa bağımlı olan büyük veya küçük tuvaletini tutamayıp cildi sürekli nemli kalanlar, yeterli beslenemeyen bireyler risk grubundadır.

Vücudumuzda en çok basınca maruz kalan ve yatak yarası açılan bölgeler;


Omuz, sırt, kalça, kalçanın yan yüzleri, kuyruk sokumu, dizler, dirsekler, ayak bileğinin yan yüzleri, topuklar gibi kemik çıkıntılar yatak yarasının en çok görüldüğü bölgelerdir.



Şekil.2: Yatak yarasının oluştuğu bölgeler kırmızı noktalarla gösterilmiştir.

5

Yatak Yaralarını Önlemek İçin



Yatak Yarısından Korunmak için Neler Yapmalıyız?

Yatak Yarasının Evreleri

Yatak yaraları 4 aşamadan meydana gelir. Evre 1 hafif kızarıklık iken evre 4 derin bir yarayı ifade eder. Evre 3 ve evre 4 yaralar hemen iyileşmez tedavisi ve pansumanı bazen aylar sürebilir.

Doktorunuz veya hemşireniz yarayı evresine göre tedavi eder ve değerlendirir. Lütfen tedavi sürecinde doktor ve hemşirenizin önerilerine uyunuz.

Yatak Yarası Niçin Önemlidir?

Yatak yaraları birden bire ortaya çıkabilir. Bu nedenle erken dönemde önlemlerin alınması yaranın meydana gelmesini ve kötüleşmesini önlemek için gereklidir.

- Yatak yaraları sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve hastanede kalış sürenizin uzamasına neden olabilir.
- Yatak yaraları ağrı yapabilir ve dikkat edilmediği durumlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
- Cilt altından daha derinlere, kas ve kemiklere kadar doku tahribatına neden olabilir.

6


Yatak Yarasını Nasıl Önleyebilirsiniz?

Yatak yarasını önlemenin 3 önemli yolu:

1. Baskı noktalarını azaltmak için pozisyon değişimi yani hareket etmek,
2. Cilt bakımı ve temizliği,
3. Dengeli Beslenme,

Simit minderler, kalçanın diğer bölgelerini basınca maruz bırakacağından dolayı kullanımı önerilmez.

Şekil.3: İdeal pozisyon 30° C baş yukarıda, yan yatış pozisyonu



• Pozisyon değişimi çok önemlidir

•Yatağa tam bağımlı bireyin pozisyon değişimi en azından saat başı yapılmalıdır.

•Kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgeler (topuk, diz, dirsek, kalçaların yan yüzleri, kuyruk sokumu, sırt, omuzlar) kızarıklık bakımından her gün değerlendirilmelidir.

7

Kızarıklık durumunda pozisyon deęiřimi yapılmalı ve saęlık personelinden yardım alınmalıdır.


• Yataęa baęımlı birey 30° eęimli yan yatıř pozisyonunda yatmalı ve bařı, kolları, dizleri, topukları yastıkla ya da özel ortopedik ürünlerle desteklenmelidir.

• Yataęa baęımlı bireylere masaj yapılması önerilmez. Çünkü sert yapılan masaj dokulara zarar verir.

• Yataęa baęımlı bireyler için özel hazırlanmıř basınç azaltıcı havalı yatak, tekerlekli sandalye kullanan bireyler için de özel basınç giderici minderler kullanılmalıdır.

• Yemek yerken dik oturmak önemlidir. Ancak yarım saat-ten fazla bu pozisyonda oturulmamalıdır.

• Tekerlekli sandalye kullanıyorsanız sandalyede otururken, 15 dakikada bir kalçanızı sandalyeden kaldırmanız ve her 15 dakikada bir tekrarlanması önerilmektedir. (Aynı durum tuvalet ssandalyesinde yada sürgüde otururken de geçerlidir)



Şekil.4: Pozisyon deęiřim ve destek noktaları

Vücut Temizlięi

• Günlük vücut temizlięi pamuklu bezlerle yapılmalıdır. Islak mendil gibi (içerięinde alkol vs olan) ürünler vücut temizlięinde kullanılmamalıdır.

• Banyo yada duř ılık su ve sabunla yapılmalıdır.

Kuru cilt, sürtünme ile birlikte kaęıt gibi yırtılır. Cildinizin kurummasını ve çatlamasını önlemek için E vitamini nemlendirici vücut losyonları kullanılmalıdır.

• Yatak takımları (evde dahi) günde en az 2 kez deęiřtirilmelidir. Yatak takımları düzgün ve kırıkksız olmalıdır.

• Birey büyük ve küçük tuvaletini kaçıрма açısından deęerlendirilmelidir. Vücudu nemli, terli ve kirli bırakılmamalıdır.

• Kalça ve bacak aralarının uzun süre nemli kalması piřik ve mantara neden olur. Eęer birey tuvaletini kaçıyorsa bez kullanımı gerekli ise bez kirlenir kirlenmez hemen deęiřtirilmelidir.

• Bez temiz dahi olsa en geç 2 - 4 saatte bir yenisi ile deęiřtirilmelidir.

Neme baęlı oluřan piřiklerde ıslaklıęı kurutmak ve derideki nemi almak için kesinlikle ısı lambaları kullanılması önerilmez. Çünkü cilt kuruluęu ve yanıklara neden olur. Hasta güvenlięini tehdit eder.

- Baęcıklı, kilot bez kullanılmamalıdır. Bez seçiminde kullanılan hazır bezin pamuklu, antialerjik ve ergonomik olmasına özen gösterilmelidir.
- Pijamaları pamuklu kumaştan ve uzun kollu olmalı ve terledikçe günlük olarak deęiştirilmelidir.
- Ayak bakımına önem verilmelidir (özellikle kan dolaşımı ile ilgili sorunlarınız, geçirilmiş felç, şeker hastalığına baęlı duyu kaybınız var ise bu daha da önem kazanmaktadır).
- Sigara, dięer zararlarının yanında ayrıca kan damarlarının daralmasına ve kan akışının azalmasına neden olur kullanılmamalıdır.
- Dengeli beslenme sağlanmalıdır. İyi beslenme yara iyileşmesini hızlandırır. Et, süt, yumurta, tavuk eti balık gibi protein ve demir kaynaklı beslenme cildin hızlı iyileşmesini sağlar, baęışıklık sistemini kuvvetlendirir ve enfeksiyonu önler. Bol sebze, meyve, tahıllar, hububatlı ekmek gibi gıdalar C, E vitaminleri yönünden zengindir ve yara iyileşmesini sağlamaktadır.
- Çok zayıf ve çok kilolu olmak yatak yarası açısından yüksek risk grubudur.
- Şeker hastalığınız varsa düzenli kan şekeri takibinin yapılması ve kan şekeri seviyesinin normal sınırlara çekilmesi, bu yaraların hızla iyileşmesine katkıda bulunmaktadır.

10

Erken Dönemde Yatak Yarası İşaretlerini Nasıl Fark Ederiz?



Yatak Yaralarını Önlemek İçin

- Günde 2 kez vücudun kemiksi çıkıntılarının olduęu bölgeler kontrol edilmelidir. kızarıklık, morluk, mavilik sıyrık, çizik, sürtünme, çatlak, nasır, cilt kuruluęu, ciltte parlama, şişlik, sertlik, ısı artışı, ağrı açısından deęerlendirilmelidir.
- Yalnız yaşıyan hastalar günlük muayenelerinde göremedikleri alanları aynayla kontrol etmelidirler.

Ciltte kızarıklık ya da dięer şikâyetlerden birini bulursanız pozisyon deęişimi yapılmalıdır. Pozisyon deęişimine rağmen 30 ile 45 dakika arasında bir zaman geçtięi halde kızarıklık hala devam ediyorsa, o kısım üzerinde 24 saat oturmamaya veya yatmamaya çalışılmalıdır. Yatak yarasının en iyi tedavisi hasar görmüş ciltteki baskıyı (basıncı) iyileşinceye kadar azaltmak yani uygun pozisyonla yükü hafifletmektir.

Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

- Pozisyon deęişimi (düzenli hareket)
 - Vücut temizlięi
 - Dengeli beslenme
- Eęer Yaranız var ise doktorunuz ya da hemşireniz dışında başka insanların tavsiyelerine itibar etmeyiniz. Her yara farklıdır. Önlemek sağlıklı olmanın ilk adıdır.*

11



Kaynak :

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. (Çev. Yara ostomi inkontinans hemşireleri derneği). Basınç ülserlerini önleme: Hızlı Başvuru Klavuzu, Ankara, 2010. (www.npuap.org) (www.ep-uap.org) Erişim: 28.8.2014.
2. Australian Wound Management Association). Web sitesi: www.awma.com.au 28.8.2014

**Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilimdalı
Stoma ve Yara Bakım Eğitim Bölümü**

Hazırlayan: Uzman Hemşire Zehra Esin GENCER

Bizlere ilgili olduğunuz klinik doktor ve hemşireleri
aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.